

Förebyggande åtgärder mot smittspridning via injektionsläkemedel

Skriven 2002 10 16
Senast reviderad 2011 01 26
Status 2012 03 02

Godkänd/Ingemar Qvarfordt (sektionschef Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Christina Raner (chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Björn Hamborg (chefläkare Kungälv sjukhus), Ola Blomqvist (chefläkare Caphio Lundby Närsjukhus), Gunnar Rimbäck (chefläkare Frölunda specialistsjukhus)

Vårdrelaterad blodburen smitta har förekommit när injektionsläkemedel i förpackning avsedd för flergångsbruk använts till flera patienter. För att förhindra smittspridning gäller följande:

- 1 **Engångsspruta ska aldrig återfyllas.** Detta gäller även vid tillförsel av upprepade doser till en och samma patient.
- 2 Vid genomspolning av intravenös infart med natriumklorid 9 mg/ml ska **enbart** endos plastampull alternativt från tillverkare färdigställd endosspruta användas.
- 3 Vid beredning av läkemedel med natriumklorid 9 mg/ml ska endos plastampull alternativt engångsförpackning användas. Eventuella rester kasseras efter det att beredning färdigställt.
- 4 Läkemedel avsedda för flergångsbruk exempelvis heparin, lokalanestetika, sterilt vatten och kontrastmedel ska hanteras i läkemedelsberedningsrum.

Undantag från punkt 4 kräver att ansvarig verksamhetschef utfärdar skriftlig rutin för det enskilda läkemedel som avses.

[Lämna gärna synpunkter på dokumentet »](#)