

Direktiv Punktdesinfektion

Vårdhygien

Skriven 2000 10 03
Senast reviderat 2011 06 30
Status 2012 02 15

Godkänd/Ingemar Qvarfordt, sektionschef Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Christina Raner, chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Björn Hamborg, chefläkare Kungälv sjukhus, Gunnar Rimbäck, chefläkare Frölunda Specialistsjukhus, Ola Blomqvist, chefläkare Capio Lundby Närsjukhus

Smittrening av ytor vid spill av kroppsvätskor och utsöndringar.

Punktdesinfektion

Punktdesinfektion är en viktig åtgärd för att förhindra smittspridning i vårdarbetet och ska alltid utföras:

- vid spill av till exempel blod, urin, avföring eller sårsekret eftersom kroppsvätskor och utsöndringar kan innehålla stora mängder smittämnen.
- direkt, av vårdpersonal.

Vårdpersonal ansvarar också för att punktdesinfektion utförs i vårdenhetens gemensamma utrymmen, samt vid upptäckt av tidigare spill till exempel på patienttoaletter.

Tillvägagångssätt

Tag rikligt med desinfektionsmedel på en engångsduk och bearbeta den förorenade ytan. När ytan är synligt ren och torr är den desinfikerad.

Inverknings tiden för desinfektionsmedlet = bearbetningstiden av ytan.

Desinfektionsmedel (i Västra Götalandsregionen upphandlade produkter)

Alkohol 70 %	används vid mindre spill, det vill säga spill som kan torkas upp med en tvättlapp. Blir ytan inte synligt ren använd rengöringsmedel och vatten, bearbeta ytan, torka torrt och utför därefter desinfektion med 70 % alkohol.
Alkohol 70 % med tensid	används vid mindre spill, det vill säga spill som kan torkas upp med en tvättlapp samt vid synligt förorenad yta där både rengöring och desinfektion av ytan behövs.
Virkon 1 %	används vid större spill, det vill säga där mer än en tvättlapp behövs för att torka upp spillet. Mekanisk bearbetning av ytan.

Specialrutiner förekommer vid

[Virusgastroenterit](#)

[Tuberkulos](#)

[Creutzfeldt-Jakobs sjukdom](#)

Städning kan utföras som vanligt av städpersonal förutsatt att korrekt punktdesinfektion enligt ovan är utförd.