

Skriven 2000 10 03  
Senast reviderad 2007 06 07  
Status Godkänd Catarina Aneman  
Sida 1 (1)

---

Patienter som behandlas med eller nyligen behandlats med antibiotika kan få diarré. Detta på grund av att den normala tarmfloran rubbats genom att antibiotikakänsliga bakterier eliminerats och *Clostridium difficile* tagit överhanden. Diarrésymtomen orsakas av att *Clostridium difficile* bildar ett toxin. Sjukhus spridning av *Clostridium difficile* är ovanlig men kan förekomma, framför allt till individer som antibiotikabehandlats. Tillämpas basala hygienrutiner är smittrisen mycket liten. Patienter med diarré skall äta på rummet. Personal som vårdar patient med diarré får inte hantera livsmedel.

## Diagnostik och provtagning

Vid misstanke om antibiotikautlöst diarré tas faecesprov (1-3 ml) i tomt rör med spatel för toxinbestämning. Någon uppföljande provtagning vid symptomfrihet behövs inte.

## Sedvanliga basala hygienrutiner skall tillämpas

Se [Basala hygienrutiner](#).

## Isoleringsåtgärder

Patient med diarré bör vårdas på enkelrum med separat toalett. Om detta inte är möjligt ska patienten i varje fall inte vårdas tillsammans med annan patient som behandlas, nyligen har behandlats eller som ska behandlas med antibiotika.

Eventuell isolering kan brytas när patienten är fri från sin diarré.

## Punktdeinfektion

Smittrening av ytor vid spill av kroppsvätskor och utsöndringar utförs med alkohol 70 % eller Virkon 1 %. Om korrekt [punktdeinfektion](#) är utförd är särskild smittrening av vådrum/toalett efter vårdtillfället inte nödvändig.

## Tvätthantering

Kraftigt förorenad tvätt läggs i upplösbar plastsäck och därefter i gul plastsäck som försluts väl. Skriv avsändare med tuschpenna på gula säcken. Säcken rekvireras från TVA (Tvätteriet i Alingsås).

## Avfall

Förorenade blöjor, tvättlappar och liknande läggs i plastpåse som knyts ihop och slängs bland vanliga sopor.