

Enterovirus

Annan benämning: coxsackievirus, echovirus, poliovirus

Metoder	PCR (viruspåvisning RNA) Enterovirus RNA (kvantitativ & kvalitativ). Ingår även i cerebrospinalvätska ("likvor")-analysen "CNS- infektioner, snabb-PCR". Se även analysen Luftvägsblock
Provmaterial	PCR (viruspåvisning RNA) Cerebrospinalvätska ("likvor") *, serum*, bläsekret, faeces, vävnadsmaterial och EDTA-blod* * = Kvantifiering utförs
Provtåg	För PCR-analys minst 0,5 ml prov. För analysen "CNS- infektion, snabb- PCR" krävs 0,8 ml cerebrospinalvätska ("likvor").
Svarsrutiner	PCR (viruspåvisning RNA) Cerebrospinalvätska ("likvor")-analysen "CNS-infektion, snabb-PCR" besvaras samma dag om provet ankommer till laboratoriet senast kl 16 på vardagar eller kl 13 på helger. Kvantitativ analys av Enterovirus (RNA) utförs 1 ggr/vecka. Svar ges som 10-log av antal genomkvivalenter (Geq)/ml provmaterial. ; svarstid: 1-7 dagar. Kvalitativ analys av Enterovirus (RNA) utförs 4-5 ggr/vecka; svarstid: 1-3 dagar. Svarstider avser tiden från provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar

[Provtagningsanvisningar](#)