

Enterovirus

Annan benämning: coxsackievirus, echovirus, poliovirus

Metoder	PCR (viruspåvisning RNA) Enterovirus RNA (kvantitativ & kvalitativ). Ingår även i cerebrospinalvätska ("likvor") -analysen "CNS- infektioner, snabb-PCR". Se även analysen Luftvägsblock
Provmaterial	PCR (viruspåvisning RNA) Cerebrospinalvätska ("likvor") *, serum*, blåssekret, faeces, vävnadsmaterial och EDTA-blod* * = Kvantifiering utförs
Provtåg	För PCR-analys minst 0,5 ml prov. HSV1, HSV2, VZV, HHV6, HHV7, HHV8, Parvovirus, Adenovirus, JC-virus och Enterovirus kan samfyllas med maximalt 8 analyser per prov med minst 0,5 mL provmaterial för kvantifiering (PCR). För analysen "CNS- infektion, snabb- PCR" krävs 0,8 ml cerebrospinalvätska ("likvor")
Svarsrutiner	PCR (viruspåvisning RNA) Cerebrospinalvätska ("likvor") -analysen "CNS-infektion, snabb-PCR" besvaras samma dag om provet ankommer till laboratoriet senast kl 16 på vardagar eller kl 13 på helger. Kvantitativ analys av Enterovirus (RNA) utförs 1 ggr/vecka. Svar ges som 10-log av antal genomekvivalenter (Geq)/ml provmaterial. svarstid:: 1-7 dagar Kvalitativ analys av Enterovirus (RNA) utförs 4-5 ggr/vecka; svarstid: 1-3 dagar Svarstider avser tiden från provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar

[Provtagningsanvisningar](#)