

Pneumocystis jirovecii

Indikation

Misstanke om infektion med *Pneumocystis jirovecii* (tidigare *P. carinii*).

Provmaterial/provtagning

Sputumprov, trachealsekret eller bronkoskopprov. Se bronkoskopprov/sputumprov ([nedre luftvägsprov](#)). Blod analyseras inte rutinmässigt men i vissa fall kan det vara aktuellt och då ska serumrör användas.

Analysprincip

PCR (Polymerase Chain Reaction).

Provtransport

Omgående transport till laboratoriet. Vid förvaring: Kylskåp.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#). Begär undersökning avseende *Pneumocystis jirovecii*.

Bedömning och svarsrutiner

I svaret anges om provet är positivt eller negativt för *P. jirovecii*. Svarstiden är 1–5 dygn och proverna svaras ut via Central Registret (CR). För de kunder som inte är anslutna till CR skickas provsvaren per fax eller brev.

Svarstider avser tiden från att provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut.
Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar

Tänk på:

Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum.

Läs mer

[Provtagningsmateriel mikrobiologi](#)