

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

Indikation

Misstanke om förekomst av VRE.

Provmaterial

Faeces, rektum med synlig förekomst av avföring, samt i förekommande fall sår, hudlesioner, drän mm. Urin (om patienten har/haft KAD eller kateteriseras intermittent eller har UVI-symtom).

OBS! Analysen utförs inte på prov från näsa, svalg eller perineum.

Provtagning

Prover tas med provtagningspinnar ex Eswab. Använd sterilt rör utan tillsats för urinprover.

Provtransport

Omgående transport till laboratoriet. Vid förvaring: kylskåp.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#) eller elektronisk beställning. Frågeställning "VRE" måste alltid anges.

Bedömning och svarsrutiner

- VRE har ej påvisats.
- Vid växt av VRE anges art samt resistensmönster.

Proverna svaras ut elektroniskt, och för de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev. En majoritet av prover som är negativa för VRE svaras ut till kund två arbetsdagar efter att provet kommit till laboratoriet. För VRE-positiva prover tar analysen något längre tid.

Läs mer

- [Provtagningsmateriel mikrobiologi](#)
- [Remiss](#)